

## Plan działań przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka

1. Do przedszkola nie przyprowadza się dziecka chorego.
2. W przedszkolu zabronione jest podawanie jakichkolwiek leków.
3. Przedszkole wysyła do domu dziecko w następujących przypadkach gdy:
  - dziecko jest zbyt chore, by uczestniczyć w zajęciach,
  - stan dziecka wymaga fachowej opieki,
  - stan dzieci naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą,
  - na ciele dziecka zaobserwuje się wysypkę, której towarzyszy podwyższona temperatura ciała oraz w przypadku pojawienia się swędzących, pęcherzykowatych wyprysków,
  - dziecko zachowuje się niepokojąco /płacz, drażliwość, apatia/, i stan ten utrzymuje się dłuższy czas,
  - dziecko ma objawy ropnego zapalenia spojówek,
  - dziecko ma problemy z oddychaniem,
  - dziecko ma biegunkę lub wymioty,
  - dziecko ma owrzodzoną jamę ustną,
  - zaobserwowano symptomy chorób zakaźnych,
  - dziecko kilkakrotnie zwraca uwagę na określone dolegliwości.
4. Dziecko może wrócić do przedszkola w następujących przypadkach i terminach:

**Zapalenie gardła lub górnych dróg oddechowych** – po 24 godzinach leczenia, lub po 24 godzinach od chwili ustąpienia wysokiej temperatury.

**Owrrzodzenie jamy ustnej** – w terminie ustalonym przez lekarza.

**Zapalenie spojówek** – po 24 godzinach od chwili rozpoczęcia leczenia.

**Wszy lub świerz b** – do ustąpienia objawów, wyleczenia i usunięcia pasożytów.

**Glista ludzka i owsiki** – do całkowitego wyleczenia i przedłożenia dyrektorowi dwóch aktualnych badań na obecność pasożytów.

**Wietrzna ospa** – 2 tygodnie po pojawieniu się wysypki.

**Liszajec** – po 24 godzinach od rozpoczęcia leczenia.

**Świnka** – 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów.

**Koklusz** – po 5 dniowym okresie zażywania antybiotyków.

5. We wszystkich przypadkach konieczna jest konsultacja lekarska !
6. Po zażywaniu antybiotyków dziecko jest osłabione i wymaga kwarantanny!
7. Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, jeżeli w jego oczach lub nosie zaobserwowano ropną wydzielinę, jeżeli dziecko bardzo kaszle, lub gdy odczuwa ból zęba, gardła, ucha, albo odczuwa mdłości.
8. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń.
9. Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.
10. Nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, ponieważ zarażają innych podopiecznych.

Konsultacja lekarska: .....

Opracowano na podstawie artykułu M. Broniszewskiej /W/ „Dyrektor Przedszkola”